

Pavo



S.O.S. Kit

til føl

Overlevelses pakke
til det nyfødte føl



Pavo S.O.S. Kit

Hoppens første mælk kaldes også for råmælk. Denne mælk har et højt indhold af antistoffer, der beskytter føllet mod infektion i de første levemåneder.

Hopper dør nogle gange under eller lige efter folingen. Hvis dette sker, så skal du malke så meget råmælk fra yveret som muligt og give det til føllet med en sutteflaske. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, så er Pavo S.O.S. Kit et godt alternativ.

Dette S.O.S. Kit indeholder alle de næringsstoffer, som føllet har behov for i sine første to levedøgn.

- Hvis noget går galt med hoppe eller føl under folingen, så skal du altid ringe til dyrlægen. Tid er en afgørende faktor for føllets overlevelseshancer.
- Pavo S.O.S. Kit skal helst anvendes inden for 3 timer efter fødslen (og ikke senere end 12 timer).
- Hvis din hoppe eller dit føl dør i forbindelse med foling kan Hestens Værns ammehjælp med døgnvagt på to hestehospitaler hjælpe med kontakt til ammehoppe eller føl. Sjælland tlf. 35 33 28 60 (Universitetshospitalet for Store Husdyr – tidl. KVL). Jylland tlf. 75 29 70 66 (Ansager Dyrehospital). SMS-service i samarbejde med EverHorse: Klik ind på www.ammehopper.dk. Her efterlyser du ammehoppe til dit moderløse føl eller tilbyder din hoppe som ammehoppe for et andet føl. Du får en SMS-besked, når der er et match. (Kilde: www.hestens-vaern.dk)

Indhold i dette S.O.S. Kit

- 2 poser Pavo Råmælk til føl (indeholder 150 g pr. pose)
- 1 pose Pavo Følmælk (indeholder 1500 g pr. pose)
- 1 flaske med sut

Brugsanvisning for Pavo S.O.S. Kit

Trin 1: tilberedning af 1 liter følmælk

1. Tag en gryde, der kan rumme mindst 1 liter.
2. Hæld 3 dl koldt vand i gryden.
3. Fyld op med 4 dl kogende vand. Herved har du 7 dl vand, der er ca. 60 °C varmt.
4. Tilsæt 1 måleske (= 100 gram) Pavo Følmælk-pulver og rør til det er helt opløst.
5. Tilsæt 3 dl koldt vand under konstant omrøring. Du har nu 1 liter lunken følmælk (temperatur ca. 40 °C).

Trin 2: tilberedning af råmælk

- Tilsæt hele indholdet af en pose Pavo Råmælk (= 150 g) til 1 liter lunken følmælk under konstant omrøring. Fortsæt med at røre til det er fuldstændigt opløst.

Trin 3: tildeling af råmælk

- Klip spidsen af sutten af med en saks. Herved fremkommer en lille åbning, hvor føllet kan sutte mælken.
- Tildel ca. 250 ml lunken råmælk (ca. 40°C hver time ved brug af pakningens sutteflaske).

Gentag trin 1 til og med 3 for at tilberede den anden pose Pavo Råmælk.

Efter tildeling af den anden pose råmælk kan føllet fodres udelukkende med følmælk ifølge vedlagte fodringstabel.

Tilberedningstips:

- Det anbefales at opvarme råmælken eller holde den varm i et vandbad. Dvs opvarmning i eller over en beholder med varmt vand. Brug en gryde eller skål, der kan indeholde mindst 1 liter og sæt denne i eller over en større gryde med meget varmt vand. Ved brug af vandbad undgås, at mælken danner skind eller brænder på.
- Råmælk må aldrig opvarmes i mikrobølgeovn. Råmælkens beskyttende antistoffer kan nedbrydes ved meget høj temperatur. Det er dog i orden at opvarme følmælk i mikrobølgeovn.

Fodringstabel for (moderløse) føl (fødselsvægt 50-60 kg)

alder	Pavo Følmælk		Hø af god kvalitet (kg/dag)	Pavo Podo®Start (kg/dag)	Pavo Podo®Grow (kg/dag)
	Antal fodringer pr. dag	ml pr. fodring			
Dag 1 – 2*	18	400			
Dag 3 – 4	12	650			
Dag 5 – 7	10	850			
Uge 2 – 3	8	1300			
Uge 4 – 5	8	1500	0.5	0.3	
Uge 6 – 9	6	2500	0.8	0.5	
Uge 10 – 12	6	1500	1.4	0.8	
Uge 13 – 15	4	750	2.2	1.2	
Måned 4 – 5			2.5	1.5	
Måned 6 – 8			3.1	2.0	2.0
Måned 9 – 12			3.7		1.5
År 1 – 2			4.3		1.5
År 2 – 3			5.0		1.5

* De første 2 døgn tilsættes Pavo Råmælk.

Fodringstabel for (moderløse) ponyføl (fødselsvægt ca. 30 kg)

alder	Pavo Følmælk		Hø af god kvalitet (kg/dag)	Pavo Podo®Start (kg/dag)	Pavo Podo®Grow (kg/dag)
	Number of feeds per day	ml per feed			
Dag 1 – 2*	18	240			
Dag 3 – 4	12	400			
Dag 5 – 7	10	540			
Uge 2 – 3	8	830			
Uge 4 – 5	8	1000	0.3	0.1	
Uge 6 – 9	6	1600	0.5	0.2	
Uge 10 – 12	6	950	0.9	0.4	
Uge 13 – 15	4	450	1.4	0.5	
Måned 4 – 5			1.6	1.0	
Måned 6 – 8			2.0	1.5	1.5
Måned 9 – 12			2.4		1.0
År 1 – 2			2.8		1.0
År 2 – 3			3.2		1.0

* De første 2 døgn tilsættes Pavo Råmælk.

Fodringtips

- Hvis føllet ikke vil drikke råmælken, kan du stimulere appetitten ved at putte lidt sukker på fyllets tunge.
- Tving ikke fyllet til at drikke ved at bøje fyllets hoved bagover. Hvis du gør dette, kan fyllet ikke synke ordentligt og der er risiko for, at mælken ender i lungerne.
- Tildel aldrig mere end 500 ml råmælk pr. time. Overdrevent indtag kan føre til tarm problemer.
- Overhold god hygiejne. Sørg for at dine hænder er rene, før du tilbereder mælken, og rengør sut, flaske og drikkestrug omhyggeligt efter brug.

Hvis du ønsker personlig rådgivning til din hest eller pony, så ring til Pavo Grooming Team på + 45 74 83 39 01. For yderligere information og kontaktoplysninger kan du besøge vores hjemmeside www.pavo.dk